

O-R

OXAN.ROMEO.FREE.FR



Les aliments que nos chiens doivent éviter



Dossier N°18
13/10/2013



Voici la liste des aliments que nos chiens doivent éviter et pourquoi, ainsi que la conduite à tenir en cas de reconnaissance de certains symptômes d'ingestion.

- **Abricots, Cerises, Pêches, Poires, Prunes, le Raisin (sec ou frais)** : Les noyaux ou pépins contiennent du glycoside cyanogénique qui peut causer un empoisonnement. Symptômes : vomissements, diarrhées, tachycardie, coma, mort.

- **Avocat:** L'avocat contient un élément toxique appelé persiflé qui peut causer des dommages au cœur, aux poumons ou à d'autres tissus chez la plupart des animaux.

- **Champignons:** Tout comme chez l'être humain, l'empoisonnement par des champignons peut être fatal. Ils peuvent causer de graves problèmes au foie et des dérèglements neurologiques. **Consultez immédiatement votre vétérinaire si vous soupçonnez que votre animal a mangé des champignons.**

- **Oignons:** Les oignons peuvent causer une anémie hémolytique, ce qui signifie que les globules rouges sont détruits prématurément dans le sang, tandis que leur taux de production demeure normal. L'empoisonnement peut se produire soit par l'ingestion de grandes quantités, soit par l'ingestion répétée de plus petites quantités. **L'intoxication peut survenir quelques jours après que le chien ait mangé des oignons.** Des vomissements, des diarrhées, une faiblesse et une perte d'appétit peuvent apparaître. L'urine prend une couleur foncée. Le chien peut avoir une respiration courte car le nombre des globules rouges (qui transportent l'oxygène) se retrouve réduit. Autres symptômes : température corporelle élevée, confusion et augmentation du rythme cardiaque.

- **Ail:** Contient une substance toxique, le thiosulfate, il semblerait que celui-ci soit moins toxique que les oignons et que de grandes quantités devraient être absorbées pour causer une intoxication.

- **Noix:** Les noix en général ne sont pas idéales pour les animaux car elles sont très riches en phosphore et peu digestes pour les carnivores.

- **Noix de Macadamia:** Le composant toxique est inconnu mais l'ingestion de quantités aussi faibles que six noix peut causer une élévation de la température, une augmentation du rythme cardiaque, des tremblements et une faiblesse, voire une paralysie du train arrière. Symptômes : difficultés à se lever, détresse, halètement, membres enflés et douleurs aux membres.

- **Noix de Muscade:** La noix de muscade est hallucinogène quand elle est ingérée en grandes quantités.

- **Chou, navet, pomme de terre:** Leur ingestion provoque des gaz suite à la fermentation dans l'estomac et provoque des diarrhées.

- **Le blanc d'œuf cru :** Contient de l'avidine, qui détruit la biotine, vitamine B8, utile au métabolisme des protéines et des graisses.



- **Chocolat**: Le chocolat contient de la théobromine, un composant qui agit comme stimulant cardiaque et comme diurétique. Si un chien mange trop de chocolat, il peut devenir excité et hyperactif. A cause de l'effet diurétique, il va uriner et boire beaucoup. Il pourra également avoir la diarrhée et des vomissements. L'effet de la théobromine sur le cœur est plus dangereux. La théobromine va soit augmenter le rythme cardiaque, soit provoquer des battements irréguliers. **La mort est même possible, surtout si le chien fait de l'exercice. De grandes quantités de chocolat peuvent empoisonner ou même tuer un chien de taille moyenne ou grande.** 50 grammes de chocolat peuvent tuer un chien de 5 kg ou moins. Les symptômes n'apparaissent souvent qu'après quelques heures et la mort survient dans les 24 heures. **La poudre de cacao et le chocolat à cuire sont les formes les plus toxiques** car ils contiennent plus de théobromine que le chocolat au lait. Viennent ensuite le chocolat noir et le chocolat semi-doux. Le chocolat au lait est le moins dangereux.

- **Bonbons** : Les bonbons sans sucre contenant du xylitol sont considérés dangereux pour les animaux de compagnie. **Ce composant peut causer des dommages au foie et même la mort chez certains chiens.**

- **Pâte à pain**: Quand de la pâte à pain est ingérée, la température corporelle de votre animal fait lever la pâte dans l'estomac. Pendant que la pâte lève, de l'alcool est produit. Symptômes : douleur abdominale, vomissements, désorientation, dépression. Un tout petit peu de pâte à pain peut déjà causer des problèmes car elle gonfle jusqu'à plusieurs fois sa taille. Le pain peut être consommé s'il est rassis.

- **Foie**: Donné en quantités raisonnables, le foie est très bon pour votre chien. En réalité, c'est un excès de foie qui peut être dommageable puisqu'il peut conduire à une hypervitaminose A. N'abusez donc pas du foie dans le régime alimentaire de votre chien. Symptômes : déformation des os, croissance excessive des os sur les épaules et la colonne vertébrale, perte de poids et perte d'appétit.

- **Os cuits** : Les os cuits peuvent être très dangereux pour votre animal. Les os deviennent cassants une fois qu'ils sont cuits ce qui forme des esquilles lorsqu'ils se cassent. Les esquilles ont des bords tranchants et peuvent rester coincées dans les dents, causer un étouffement ou une perforation des parois stomacale et intestinale. Symptômes de l'étouffement : gencives pâles ou bleues, halètement, le chien se touche la tête avec les pattes, respiration lente, inconscience, pupilles dilatées. Les os crus ne sont pas dangereux et aident

à garder les dents propres. Les os sont très riches en calcium et trop d'os peut provoquer une constipation sévère.

- **Extraits d'huile de citron:** L'extrait d'huile de citron peut provoquer des vomissements.

- **Caféine:** Les boissons contenant de la caféine tels que les sodas, le thé ou le café peuvent agir comme stimulants et accélérer le rythme cardiaque de l'animal. **L'ingestion de caféine peut provoquer des crises, parfois fatale.**

- **Produits laitiers :** La majorité des produits laitiers sont mal digérés par les chiens qui ont souvent peu ou pas du tout l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose. Tout comme chez les humains, les chiens intolérants au lactose peuvent avoir des flatulences et des diarrhées. Le fromage et le yaourt sont mieux tolérés car ils contiennent moins de lactose. Bien que quelques rares chiens tolèrent bien le lait, d'une manière générale, préférez les produits laitiers fermentés.

- **Aliments pour bébés:** Avant de donner un aliment pour bébé à votre chien, vérifiez qu'il ne contienne pas de poudre d'oignon, qui peut être toxique pour votre chien.

- **Aliments avariés :** La moisissure que l'on trouve sur la plupart des aliments avariés contient des toxines telles que la pénicilline ou des mycotoxines trémorgènes. Les symptômes se traduisent par des tremblements et des crises pouvant durer plusieurs heures ou même plusieurs jours. **Ce type d'empoisonnement est considéré comme un cas d'urgence** et un traitement médical est nécessaire pour contrôler les tremblements et détoxifier le chien. Faites particulièrement attention avec le bac à compost qui pourrait se trouver dans votre jardin.

- **Antigel:** L'antigel a un goût agréable pour les chiens et les chats. **Même une très petite quantité d'antigel peut être fatale. Si vous soupçonnez que votre animal a ingéré de l'antigel, contactez immédiatement votre vétérinaire.** Afin d'empêcher l'éthylène glycol d'être absorbé par le foie, le vétérinaire va administrer de l'éthanol à votre animal afin de contrecarrer les effets de l'éthylène glycol. **Plus le traitement est administré rapidement, plus les chances de survie sont grandes. Une fois que les reins commencent à être atteints, la plupart des animaux ne survivent pas.** Les symptômes d'une intoxication à l'antigel dépendent du laps de temps qui suit l'ingestion. Les symptômes peuvent apparaître déjà 30 minutes après l'ingestion de l'antigel et durer environ 12 heures. Les premiers symptômes sont un comportement déprimé (l'animal est couché et n'a pas d'intérêt pour ce qu'il se passe autour de lui), des vomissements, des pertes d'équilibre (l'animal semble saoul), des tremblements, des crises, une soif excessive, une urination fréquente. Après le premier stade, l'animal peut sembler aller mieux mais il se sentira beaucoup plus mal après un jour ou deux, quand les reins commenceront à défaillir. La quantité d'urine diminuera fortement dans la plupart des cas. A ce stade, le foie aura transformé l'éthylène glycol en substances beaucoup plus dangereuses. Les autres symptômes peuvent très bien passer inaperçus pendant plusieurs jours alors que des dommages irréparables sont en train de se

produire. Puis les vomissements peuvent réapparaître, ainsi qu'un manque d'appétit, de la déshydratation, une incapacité à uriner, de la salivation, des tremblements, des ulcères dans la bouche, le coma ou la mort. Les animaux qui souffrent d'une défaillance rénale suite à une intoxication à l'antigel peuvent parfois être sauvés grâce à un traitement agressif. Certains vétérinaires spécialisés peuvent mettre l'animal sous dialyse. Malheureusement, les dommages aux reins sont souvent graves et irréversibles. Des transplantations de reins ont été effectuées avec succès chez certains chiens et chats mais tous les animaux ne sont pas de bons candidats pour ce type de chirurgie et le manque de donneurs d'organes empêche les bons candidats d'y avoir recours.

